«ОДОБРЕНО»
ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан
«28» 10 2022 г. № 23

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИСОРБ МП
POLISORB MP

Торговое название препарата: Полисорб МП
Действующее вещество (МНН): кремния диоксид коллоидный
Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Состав:
Один грамм препарата содержит:
активное вещество: кремния диоксид коллоидный 1,0 г
Описание: Лёгкий белый или белый с голубоватым оттенком порошок, без запаха. При взбалтывании с водой образует суспензию.
Фармакотерапевтическая группа: энтеросорбирующее средство.
Код АТХ: A07B

Фармакологические свойства
Полисорб МП – неорганический, неселективный, полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размерами частиц до 0,09 мм, с химической формулой SiO_2. Удельная площадь поверхности препарата порядка 300 $м^2/г$. Емкость адсорбции препарата при внутреннем употреблении не менее 220 мг/г.
Фармакодинамика
Полисорб МП обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Полисорб МП сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.
Фармакокинетика
Полисорб МП не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде.

Показания к применению
- Острые и хронические интоксикации различного происхождения у взрослых и детей;
- острые кишечные инфекции любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);
- жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств с целью профилактики.

Способ применения и дозы

Полисорб МП принимают внутрь только в виде водной суспензии!

Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в 1/4-1/2 стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 час до еды или приема других лекарств.

Средняя суточная доза у взрослых 0,1- 0,2 г на 1 кг массы тела (6-12 г).

Препарат принимается в 3-4 приема в течение суток.

Максимальная суточная доза у взрослых 0,33 г на 1 кг массы тела (20 г).

Доза для детей рассчитывается в зависимости от массы тела (см. таблицу).

Таблица рекомендуемых доз препарата Полисорб МП

Вес пациента	Дозировка	Объем воды
до 10 кг	0,5 -1,5 чайные ложки в сутки	30-50 мл
11-20 кг	1 чайная ложка «без горки» на 1 прием	30-50 мл
21-30 кг	1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием	50-70 мл
31-40 кг	2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием	70-100 мл
41-60 кг	1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием	100мл
более 60 кг	1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием	100-150 мл

1 чайная ложка «с горкой» - 1 грамм препарата

1 столовая ложка «с горкой» - 2,5-3 грамма препарата.

В случаях пищевой аллергии препарат принимается непосредственно перед приемом пищи, суточную дозу Полисорб МП разделяют в течение дня на три приема.

Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания, курс лечения при острых интоксикациях 3-5 дней; при аллергических заболеваниях, хронических интоксикациях продолжительность лечения до 10-14 дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели, по рекомендации врача.

Побочные действия

Редко - аллергические реакции, диспепсия, запоры.

При длительном, более 14 дней, приеме Полисорб МП возможно нарушение всасывания витаминов, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов.

Противопоказания

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- атония кишечника;
- индивидуальная непереносимость препарата.

Особые указания

1. Пищевая токсикоинфекция и острые отравления.

Начинать терапию рекомендуется с промывания желудка 0,5-1% суспензией Полисорб МП. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-6 часов, наряду с этим препарат дают внутрь. Разовая доза у взрослых может составлять 0,1-0,15 г/кг массы тела больного по 2-3 раза в день.

2. Острые кишечные инфекции.

Рекомендуется начать лечение препаратом Полисорб МП в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В первые сутки суточная доза дается в течение 5-ти часов с интервалами между приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. Продолжительность лечения 3-5 дней.

3. Лечение вирусного гепатита.

В комплексной терапии вирусного гепатита Полисорб МП применяют как детоксицирующее средство в обычных дозах в течение первых 7-10 дней болезни.
4. Аллергические заболевания.
При острых аллергических реакциях лекарственного или пищевого генеза рекомендуется предварительное промывание желудка и кишечника 0,5-1% суспензией Полисорб МП. Затем препарат дают в обычных дозах до наступления клинического эффекта. При хронических пищевых аллергиях рекомендуются курсы Полисорб МП по 7-10-15 дней, препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы показаны при острой рецидивирующей крапивнице и отеке Квинке, эозинофилии, накануне на фоне обострения поллинозов и других атопий.
5. Хроническая почечная недостаточность.
Используют курсы лечения препаратом Полисорб МП в суточной дозе 0,15-0,2 г/кг тела в течение 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение препарата Полисорб МП при беременности и в период грудного вскармливания не противопоказано.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Не отмечено влияние препарата Полисорб МП на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами.

Передозировка
Случаев передозировки при применении препарата Полисорб МП в рекомендуемых терапевтических дозах не выявлено.

Лекарственные взаимодействия
Возможно снижение лечебного эффекта одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Форма выпуска
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.
По 3 г в пакеты одноразового использования из бумаги этикеточной с термослоем. По 10 пакетов одноразового использования вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в картонную пачку. Допускается помещать одноразовые пакеты непосредственно в групповую упаковку, инструкции по медицинскому применению вкладываются согласно количеству пакетов.
По 12/25/50 г в банках из полистирола или полиэтилена, или полиэтилентерефталата, укупоренных крышками из аналогичных материалов с контролем первого вскрытия.
На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или этикетку самоклеящуюся из бумаги или пленки. Банки упаковывают в пачку или допускается упаковывать в термоусадочную пленку от 3 до 20 штук, инструкцию по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают согласно количеству банок.
Либо на банку наклеивают сложную этикетку из бумаги или пленки, только часть которой прикрепляется к банке специальной липкой лентой, позволяющей её приподнимать. Инструкцию по медицинскому применению помещают под подвижную часть сложной этикетки, или наносят на внутреннюю часть сложной этикетки. Банки упаковывают в термоусадочную пленку от 3 до 20 штук.
Либо на банку наклеивают сложную этикетку из бумаги или пленки, только часть которой прикрепляется к банке специальной липкой лентой, позволяющей её приподнимать. Инструкцию по применению на русском языке помещают под подвижную часть сложной этикетки, или наносят на внутреннюю часть сложной этикетки. Банки упаковывают в термоусадочную пленку от 3 до 20 штук, инструкцию по медицинскому применению на государственном языке вкладывают согласно количеству банок.

Условия хранения
При температуре не выше 30°С.
После вскрытия упаковки хранить в плотно закрывающейся емкости.
Срок хранения суспензии не более 48 часов.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Адрес места производства:
АО «Полисорб»,
Россия, 456652, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д.14
Тел.: 8-800-100-19-89
Тел./факс: (351) 778-51-26

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных препаратов на территории Республики Узбекистан:
ЧП «PharmRegister» Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, ул. Мойлисой,71.
Тел.: +7(495)799-21-86, e-mail: uzbekistan@drugsafety.ru, adversereaction@ drugsafety.ru